

# TIFÓN®

FUNGICIDA AGRÍCOLA CURATIVO, SISTÉMICO

EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)

Registro bajo Norma Andina: 71 - F-17/NA

**FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:** Emulsión aceite en agua que contiene 250 g de Tebuconazole por litro de producto comercial.

**ACTIVIDAD FUNGICIDA:** Tebuconazole, es un fungicida sistémico con acción protectante y curativa y erradicante. Destruye las membranas celulares de los hongos, en las que la estructura y función de los esteroides (especialmente ergosterol) juegan un papel importante. Los Triazoles actúan como inhibidores de la biosíntesis de los esteroides y este proceso está relacionado con alteraciones de las membranas celulares.

## CARACTERÍSTICAS:

**Nombre común:** Tebuconazole

**Grupo químico:** Triazoles

**Fórmula química:** C<sub>16</sub>H<sub>22</sub>ClN<sub>3</sub>O

**Compatibilidad:** No deberá ser usado en combinación con productos alcalinos, como Caldo Bordelés o sulfuro de la cal. No deberá ser usado con arseniato de calcio o urea en cítricos. Es incompatible con productos de carácter básico, ácido u oxidante fuerte. Compatible con la mayoría del resto de los pesticidas, y agentes humectantes.

**Periodo de reingreso al área tratada:** No ingresar en las áreas tratadas durante un período de 12 horas.

**Tiempo de espera entre la última aplicación y la cosecha:**

En *fréjol* realizar la última aplicación 21 días antes de la cosecha y en *banano* 10 días.

**Frecuencia de la aplicación:** **FRÉJOL:** Aplicar cuando exista la presencia mínima del 2% de enfermedad. Realizar la siguiente aplicación a los 14 días. No realizar más de dos aplicaciones por ciclo de cultivo. **BANANO:** Iniciar las aplicaciones cuando la curva de infección inicie en intervalos de 14-15 días, "aplicar un máximo de 8 veces/año, siempre y cuando no exceda el 50% del total de ciclos de aplicación". El efecto curativo es posible cuando el tratamiento se inicia hasta 24-48 después del inicio de la infección y continúa por 6-7 días.

TABLA DE APLICACIONES Y DOSIS

| Cultivo | Plaga  | Dosis                                   | Número de aplicaciones | Intervalos de aplicación |
|---------|--|---|------------------------|--------------------------|
| Fréjol  | Mancha Angular de la hoja<br>( <i>Isaripsis griseola</i> ) | 0.75 l/ha <sup>1</sup><br>ó<br>2,0 ml/L | 4 - 5<br>veces/ciclo   | 7 - 14 días              |
| Banano  | Sigatoka negra<br>( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> )      | 0.4 l/ha <sup>2</sup><br>ó<br>2ml/L     | 8 veces / ciclo        | 14 días                  |

<sup>1</sup> En base a 600 L de agua/ha. <sup>2</sup> En base a 200 L de agua/ha

**PRESENTACIONES COMERCIALES:** Botellas 1 L, 250 mL y 125 mL.

Formulador:  
**ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA  
LTD.**



**Dirección:**  
Sofia 1000, Solunska Str. 58 B, FL.1,  
APT.1 Sofía - Bulgaria  
Teléfonos: + 3592 953 2926,  
+359 888 576735  
Correo electrónico:  
Zack.Kusheff@gmail.com

Importador y Distribuidor:  
**AGRISEC ECUADOR S.A.**



"Protegemos cultivos y personas"

**Dirección :**  
Av. República E7-03 y Av. Eloy Alfaro.  
Edif. María Victoria, piso 1, Of. 107.  
Quito - ECUADOR  
Tel.: (02) 601 6900  
E-mail: info@agrisec.com  
Página web: www.agrisec.com

**Categoría Toxicológica:** III (Ligeramente Peligroso)



**CUIDADO**

