

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS”

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

PRECAUCIONES: Causa irritación moderada a los ojos. **NO COMER, BEBER O FUMAR** mientras se manipula el producto. **EVITAR** ingerir, inhalar, o tener contacto con la boca y los ojos. **USAR** ropa protectora durante el manipuleo. Después de usar el producto **CÁMBIESE, LAVE LA ROPA** contaminada y **BÁÑESE** con abundante agua y jabón.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicaciones por: **INHALACIÓN:** Remueva a la víctima de la exposición. Remueva la ropa contaminada, permita al paciente asumir una posición más confortable y manténgalo caliente. Mantenga en descanso hasta que se recupere completamente. **CONTACTO DERMAL:** Remueva inmediatamente la ropa contaminada y lave con abundante agua y jabón el sitio contaminado. **CONTACTO OCULAR:** Lave los ojos con abundante agua. **INGESTIÓN:** Lave inmediatamente la boca con agua. Induzca al vómito de a beber agua. No administrar leche, alcohol y sustancias grasas.

SÍNTOMAS: No tiene síntomas conocidos. **TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO:** El tratamiento es esencialmente sintomático. No existe antídoto específico.

MEDIDAS RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE LOS ENVASES: Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y posteriormente entréguelo a su distribuidor para la incineración según las regulaciones locales

MEDIDAS RELATIVAS A LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE: “Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales”. “No emplear este envase para ningún otro fin”. “No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos”

Para mayor información dirjase al distribuidor local o el importador especificado en la sección media de esta etiqueta, o comuníquese a:

Teléfono para atención de emergencias toxicológicas: **CIATOX en Quito: (02) 2 900 355, (02) 290 5162 o 1800 VENENO (1800 836366); o CITOX en Guayaquil al (04) 2 451 022.**

Asesor médico del importador: 0999399182

CORRIDABUL®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Ingredientes:

Diflubenzuron, i.a..... 480 g/l
Excipientes..... 520 g/l

Registro Nacional: 064-I 2 / NA

Número de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

P.V.P.: USD

Fabricado por:
Zenith Crop Sciences
Bulgaria LTD

Calle Solunska No 58
B, entr. B. piso 1, ap.
1, Sofia 1000. Bulgaria

Titular del Registro e

Importador:
AGRISEC ECUADOR S.A.

Av. República 700 y La Pradera
Edif. María Victoria, piso 1, Of.
107, Quito - Ecuador
Tel.: (02) 254-3581
Correo electrónico:
info@agrise.com
Página web:
www.agrise.com

Distribuido por:

MODO DE EMPLEO: CORRIDABUL, insecticida con acción de contacto y estomacal, perteneciente al grupo químico Benzoil urea. Para su uso recomienda agitar vigorosamente el recipiente original del producto antes de verterlo al tanque de mezcla o premezcla. Cuando es poca cantidad la que se va a aplicar (2 o 3 bombas) se recomienda hacer la mezcla necesaria de Corridabul

requerida para cada bomba y para cada una preparar una premezcla, en un recipiente pequeño agitarla y luego agregarla a la bomba. Cuando es bastante cantidad, ésta se puede preparar un tanque grande, conociendo cuantas bombas pueden llenarse con ese volumen y allí preparar la mezcla, y cada vez que finalice el contenido de una bomba, regresar a llenar otra, hasta que termine el contenido del barril. Usar guantes, mascarilla, ropa de mangas largas y botas impermeables.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gusano blanco (<i>Premnotrypes vorax</i>)	175 ml /200 l agua
Palma Africana (<i>Elaeis guineensis</i>)	Barrenador de raíces (<i>Sagalassa valida</i>)	1,00 ml/palma en 2 litros de agua

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Papa: para manejo de gusano blanco, realizar 3 aplicaciones de CORRIDABUL a los 40, 60 y 80 días a partir de la siembra.

Palma africana: para control del “barrenador de las raíces” aplicar CORRIDABUL en frecuencias de 0, 21, 42 días, cuando en prácticas de monitoreo se compruebe el daño inicial de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO:

Ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No es compatible con compuestos azufrados y mezclas bordelés.


PERIODO DE CARENIA:

Tanto para PAPA como para PALMA AFRICANA, cosechar 14 días después de la última aplicación.

FITOTOXICIDAD: No fitotóxico en las condiciones indicadas

AVISO AL COMPRADOR: “El titular del registro garantiza, que la características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.” Norma Andina.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III Ligeramente peligroso



CUIDADO

