

Tecamín Raíz[®]

BIONUTRIENTE RADICULAR A BASE DE AMINOÁCIDOS, MICROELEMENTOS Y EXTRACTO DE ALGAS

- **ELEVADO PODER ENRAIZANTE.**
- **AUMENTA EL PORCENTAJE DE GERMINACIÓN Y PROPORCIONA UNIFORMIDAD EN EL DESARROLLO VEGETATIVO.**
- **ESTIMULA EL DESARROLLO DE PELOS RADICULARES ABSORBENTES.**
- **FAVORECE UNA RÁPIDA RECUPERACIÓN POST-TRANSPLANTE.**
- **APORTA MICRO ELEMENTOS.**



MODO DE EMPLEO:

TECAMIN RAIZ se incorporará en la zona de influencia de las raíces mediante riego por goteo, aspersión, micro-aspersión, inmersión, inyección o aplicación dirigida a la banda de plantación mediante mochila o equipo de pulverización provisto de picos para aplicación de fertilizantes que aseguren la incorporación del producto a la zona radicular. Se aconseja aplicar cuando sea necesario favorecer el desarrollo radicular, semillero, vivero o almacigo o período crítico del trasplante, así como también en plantaciones establecidas después de un período de daños del sistema radicular por encharcamiento, sequía, sales, enfermedades, plagas, etc.

Está preparado para utilizar en todo tipo de cultivos: berries o bayas, hortalizas, frutales, cítricos, vid, florales, ornamentales, etc.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Aminoácidos Libres "L"	4,7 % p/p
Materia Orgánica Total	22 % p/p
Nitrógeno Total (N)	5,5 % p/p
Potasio Total (K ₂ O)	1,0 % p/p
Fe – HEDTA	0,5 % p/p
Mn	0,3 % p/p
Zn	0,15 % p/p
Cu	0,05 % p/p
B	0,05 % p/p
Extracto de Algas	4,0 % p/p
pH	4,4

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS
VIVERO – PLANTINERA SEMILLERO (ornamentales, horticolas, berries o bayas, pies de injertos, aromáticas, frutales, cítricos, forestales)	Semilla: - Aplicar con el riego luego de la aparición de la primera hoja verdadera, repetir 2-3 veces cada 7-8 días.	2-3 cc/l ó 0,2-0,3 L/hl
	Estaca, esqueje, etc.: - Aplicar con el riego 2-3 veces cada 9-10 días.	4-5 cc/l ó 0,4-0,5 L/hl
	Aplicación mediante inmersión de bandejas: - Se puede combinar con cualquier insecticida, fungicida.	8-10 cc/L ó 0,8-1 L/hl
CITRICOS-FRUTALES TROPICALES (naranja, mandarino, lima, limón, toronja, manzana, peral, melocotón, cerezo, ciruelo, albaricoque, olivo mango, papaya, aguacate, guayaba, café, etc.)	- Incorporar con el riego a los 3-4 días después de la siembra ó repique, aplicar cada 7 días, durante su estancia en semillero, vivero o almacigo.	2-3 cc/L ó 0,2-0,3 L/hl
	- En el trasplante o riego. Se puede combinar con cualquier insecticida, fungicida. - Con el primer riego en plantación definitiva.	6-8 cc/árbol 3-4 L/ha
HORTICOLAS (cebolla, ajo, papa, melón, zanahoria, lechuga, acelga, espinaca, apio, pimiento, coliflor, brócoli, tomate, pepino, calabaza, arveja, fréjol, sandía, frutilla, espárrago, etc.)	- En siembras definitivas, incorporar con el riego a los 3-5 días después de la germinación, aplicar cada 7-8 días. Repetir 2-3 veces.	2-3 cc/L ó 0,2-0,3 L/hl
	- En el trasplante, riego o inmersión de las bandejas. Con el primer riego en plantación definitiva. Repetir a los 10-12 días.	5 cc/L
	- Después de cada corte.	3 L/ha
ORNAMENTALES (rosa, gerbera, alstroemeria, gypsophyla, crisantemo clavel, orquídeas, etc.)	Plantas en Maceta y Flor de corte: - Incorporar con el riego a los 3-4 días después de la siembra o repique de estacas, aplicar cada 7 días. Repetir 2-3 veces.	2-3 cc/L ó 0,2-0,3 L/hl
	Flor de corte: luego de cada corte y de podas. - En siembra del vivero, por inmersión.	2-3 L/ha 10 cc/L
Piña	- Aplicación cada 7-10 días, hasta realizar el trasplante a plantación definitiva. - En el trasplante a plantación definitiva por inmersión.	3 L/ha 10 cc/L
Tabaco	Vivero: Incorporar con el riego a los 3-4 días de la siembra ó repique, aplicar cada 7 días. Repetir 2-3 veces.	3-4 cc/l ó 0,3-0,4 L/hl
	Al Trasplante: Repetir a los 10-12 días.	10 cc/L
Arroz, Maíz, Caña de Azúcar	- Aplicar desde la emergencia de los cultivos	0,5-1,5 L/ha
Café	- Incorporar con el riego a los 3-4 días de la siembra ó repique, aplicar cada 7 días, durante su estancia en semillero, vivero o almacigo.	2-3 mL/L
	- En el transplante	6-8 mL/árbol
	- Con el primer riego en plantación definitiva	1-2,5 L/ha



PRESENTACION:
> LIQUIDA
METODO DE APLICACION:
> RADICULAR

Importado y Distribuido:

AGRISEC ECUADOR S.A.
 Av. República 700 y La Pradera
 Edif. María Victoria, piso 1, Of. 107. QUITO - ECUADOR
 Tel.: (+593) (02) 2 558 864
 E-mail: info@agriseccom - www.agrisc.com

Formulado por:

Pol. Ind. Fte. Musa, P. 36, N. 4
 46450 Benifayó (Valencia) España
 Tel: +34 963 391 184 / Fax: +34 963 269 823
 info@agritecnofertilizantes.com
 www.agritecnofertilizantes.com



Agri-s-EC