

RESPECT^{BUL}

RESPECT^{BUL}®

FUNGICIDA PREVENTIVO Y CURATIVO, DE CONTACTO Y SISTÉMICO

POLVO MOJABLE (WP)

Registro bajo Norma Andina: 058 - F 16 / NA

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Polvo mojable con contenido de 640 g de Mancozeb y de 80 g de Cymoxanil de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

ACTIVIDAD FÚNGICA: Es un fungicida de contacto y sistémico, con acción preventiva y de post-infección cuando el hongo está en incubación. Además, posee actividad sistémica local lo cual mejora su efecto, especialmente en periodos de presión de la enfermedad.

Cymoxanil, presenta varios modos de acción posibles los cuales incluyen; la inhibición de la síntesis del ácido nucleído, respiración micelial, permeabilidad de la membrana celular y reducción de la esporulación.

Mancozeb inactiva los grupos sulfhídricos de los aminoácidos, proteínas y enzimas esenciales en la fisiología de las células de las esporas. Es un fungicida de acción multisitio por lo cual es improbable que genere resistencia en los agentes patógenos

CARACTERÍSTICAS:

Nombre Común: Mancozeb + Cymoxanil

Grupo Químico: Ditiocarbamato + Cianoacetamida Oxima

Fórmula química: Mancozeb $(C_4H_6MnN_2S_4)_x (Zn)_y$ + Cymoxanil $C_7H_{10}N_4O_3$

Compatibilidad: No deberá ser usado en combinación con productos alcalinos, como Caldo Bórdeles. No deberá ser usado con arseniato de calcio o urea en cítricos. Es incompatible con productos de carácter básico, ácido u oxidante fuerte. Compatible con la mayoría del resto de los pesticidas y agentes humectantes.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Respectbul puede ser utilizado durante todos los períodos vegetativos de los cultivos 4-5 veces. Se aplica antes o inmediatamente después de la infección, en intervalos de 7-14 días. El efecto curativo es posible cuando el tratamiento se realiza dentro de las 24-48 horas después de la infección y se mantiene por 6-7 días. El efecto preventivo se mantiene por 14 días.

Fecha de reingreso al área tratada: No ingresar en las áreas tratadas durante un período de 12 horas.

Tiempo de espera entre la última aplicación y la cosecha: 14 días.

TABLA DE APLICACIONES Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha o Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	500 g/ha *
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Pudrición de la corona (<i>Phytophthora parasítica</i> var. <i>nicotianae</i>)	2,5 g/l

* En 200 litros de agua

PRESENTACIONES COMERCIALES: Saco de 25 kg, fundas de 1 kg, 500g y 250g en colores **amarillo** y **azul**.

El polvo de color **AMARILLO** (letras amarillas) se sugiere que sea utilizado en condiciones conocidas o confianza en la aplicación, y el polvo de color **AZUL** (letras azules) para cuando se desea llevar un monitoreo más exhaustivo de sitios de aplicación y cobertura del producto.

Fabricado por:		Titular del Registro e Importador:	
AGRIA S.A.	Dirección: Asenovgradsko Shose BULGARIA, 4009 Plovdiv, Tel.: (+359 32) 63 63 69 Correo electrónico: info@agria.bg Página Web: www.agria.bg	AGRISEC ECUADOR S.A.	Dirección: Av. República E7-03 y Av. Eloy Alfaro. Edif. María Victoria, piso 1, Of. 107, Quito, Ecuador. Tel.: (02) 601 6900 Correo electrónico: bienvenidos@agrisec.com Página web: www.agrisec.com
			



CUIDADO

