

TIFÓN®

FUNGICIDA AGRÍCOLA CURATIVO, SISTÉMICO

EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)

Registro Bajo Norma Andina: 71- F 17 /NA

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Emulsión aceite en agua (EW) que contiene 250 g/L de Tebuconazole por litro de producto comercial.

COMPOSICION:

Nombre común: Tebuconazole

Grupo químico: Triazoles

Fórmula química: C₁₆H₂₂ClN₃O

ACTIVIDAD FUNGICIDA: Tebuconazole, es un fungicida sistémico con acción protectante y curativa y erradicante. Destruye las membranas celulares de los hongos, en las que la estructura y función de los esteroides (especialmente ergosterol) juegan un papel importante. Los Triazoles actúan como inhibidores de la biosíntesis de los esteroides y este proceso está relacionado con alteraciones de las membranas celulares.

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: No ingresar en las áreas tratadas durante un período de 12 horas.

FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN: **FRÉJOL:** Aplicar cuando exista la presencia mínima del 2% de enfermedad. Realizar la siguiente aplicación a los 14 días. No realizar más de dos aplicaciones por ciclo de cultivo. Con intervalos de aplicación de 7-14 días. **BANANO:** Iniciar las aplicaciones cuando la curva de infección inicie en intervalos de 14-15 días, “aplicar un máximo de 8 veces/año, siempre y cuando no exceda el 50% del total de ciclos de aplicación”. El efecto curativo es posible cuando el tratamiento se inicia hasta 24-48 después del inicio de la infección y continúa por 6-7 días. Con intervalos de aplicación de 14 días. **MANGO:** Realizar las aplicaciones cuando exista la presencia del 2% de "antracnosis" en las hojas al inicio de la época de floración. Realizar dos aplicaciones con un intervalo de 7 días por ciclo.

COMPATIBILIDAD: No deberá ser usado en combinación con productos alcalinos, como Caldo Bordelés o sulfuro de la cal. No deberá ser usado con arseniato de calcio o urea en cítricos. Es incompatible con productos de carácter básico, ácido u oxidante fuerte. Compatible con la mayoría del resto de los pesticidas, y agentes humectantes.

TABLA DE APLICACIONES Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC (Período De Carencia)
Fréjol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Mancha angular de la hoja (<i>Isariopsis griseola</i>)	0,75 L/ha	21 días
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> Morelet)	0,40 L/ha	0 días
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	0,5 L/ha	20 días

VOLUMEN DE AGUA: Fréjol: 600 litros de agua/ha. **Banano:** 200 litros de agua/ha. **Mango:** 400 litros de agua/ha

PRESENTACIONES COMERCIALES: 4 L, 1 L, 250 mL, 125 mL

FORMULADOR:
ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD.



TITULAR DEL REGISTRO :
AGRISEC ECUADOR S.A.



"Protegemos cultivos y personas"

Dirección:

75-83 Dimitar Manov Str, 1408 Sofia,
Bulgaria

Tel: + 3592 9150 500

Email: zack.kusheff@gmail.com

Página web: www.zenithcropsciences.com

Dirección:

Av. De los Shyris N34-328 y Portugal,

Edif.Smerald, piso 8, Of. 802

Quito – Ecuador

Tel.: (02) 601 6900

E-mail: info@agriseq.com

Página web: www.agriseq.com

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

